

## Gastroskopia

### Przygotowanie:

- **Nie należy jeść na 8 godzin przed badaniem.**
- **4 godziny przed badaniem nie należy pić wody.**
- Na dwie godziny przed badaniem nie należy żuć gumy.
- W dniu badania zalecane jest powstrzymanie się od palenia.
- Nie powinno się przyjmować leków przed badaniem, gdyż rozpuszczone tabletki utrudniają dokładną ocenę błony śluzowej, ewentualnie można przyjąć tylko leki stałe, bezwzględnie wskazane.
- Badania nie powinno wykonywać się podczas antybiotykoterapii - antybiotyki mogą zaburzać obraz badania, pacjent może wykonać badanie co najmniej 5 dni po odstawieniu antybiotyków.
- W trakcie badania mogą zostać podane leki przeciwbólowe i uspakajające, dlatego też konieczne jest zgłoszenie się na badanie z osobą towarzyszącą. Pacjent przez 12 godzin po podaniu leków nie może prowadzić pojazdu!
- Zalecane jest przedstawienie lekarzowi poprzednich wyników badań.

Jeśli badanie będzie wykonane w znieczuleniu ogólnym z anestezjologiem:

- Zapotrzebowanie na badanie w znieczuleniu ogólnym z anestezjologiem należy zgłaszać z momencie zapisu na badanie!
- Na kilka dni przed badaniem wymagane jest osobiste zgłoszenie się na konsultację anestezjologiczną.
- **Nie należy jeść na 8 godzin przed badaniem.**
- **Należy powstrzymać się od picia i żucia gumy na 4 godziny przed badaniem.**
- W dniu badania zalecane jest powstrzymanie się od palenia.
- Nie powinno się przyjmować leków przed badaniem, gdyż rozpuszczone tabletki utrudniają dokładną ocenę błony śluzowej, ewentualnie można przyjąć tylko leki stałe, bezwzględnie wskazane.
- Badania nie powinno wykonywać się podczas antybiotykoterapii - antybiotyki mogą zaburzać obraz badania, pacjent może wykonać badanie co najmniej 5 dni po odstawieniu antybiotyków.
- Przed badaniem w znieczuleniu nie ma konieczności zmywania lakieru z paznokci ani ściągania hybrydy/paznokci żelowych.
- Pacjent na badanie powinien zgłosić się około 30 minut przed zaplanowaną godziną badania.
- Po badaniu Pacjent pozostaje w CM Luxmed przez około godzinę.
- Podanie znieczulenia wiąże się z koniecznością przybycia do placówki z osobą towarzyszącą, która będzie oczekiwała na Pacjenta bezpośrednio po zakończeniu badania.
- W domu również należy mieć zapewnioną opiekę osoby dorosłej do rana następnego dnia.
- Przez 24 godziny po znieczuleniu nie można kierować pojazdami mechanicznymi.