

Badanie słuchu - ASSR (słuchowe potencjały wywołane stanu ustalonego)

Przygotowanie:

- Podczas badania wymagana jest cisza, badany nie może przeżuwać ani przełykać, ma zamknięte oczy, aby zredukować bodźce wzrokowe.
- U małych dzieci badanie wykonuje się najczęściej po karmieniu, podczas snu:
 - 1) W godzinach nocnych lub wcześniej rano przed badaniem (przed tradycyjną godziną wstawania) konieczne jest obudzenie dziecka i nie pozwolenie mu na ponowne zaśnięcie, aż do przyjazdu do pracowni tak, aby w godzinie badania dziecko było śpiące i zmęczone.
Należy zwrócić uwagę, aby dziecko nie zasnęło w trakcie podróży!
 - 2) Dziecko w momencie przybycia na badania powinno być lekko głodne, np. dziecko zjada ostatni posiłek wieczorem, a następnie dopiero rano w pracowni przed zaśnięciem.
Nakarmienie dziecka tuż przed badaniem zwiększa szanse na szybsze zaśnięcie dziecka.
- Dziecko zgłaszające się na badanie ASSR powinno być zdrowe. Nie zaleca się wykonywania badania ASSR podczas infekcji, ze względu na możliwość zafałszowania wyników przez wydzielinę zalegającą w nosogardle. Jeśli dziecko przeszło infekcję, na badanie ASSR najbezpieczniej zgłosić się ok. 2 tygodnie od momentu zakończenia infekcji.